

ANEXO I.-

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS NA EXPLOTACIÓN DE ORIXE

Nas primeiras dúas semanas de vida que a becerra permanece na explotación de orixe condicionamos en gran parte o futuro de dito animal no centro e, consecuentemente a súa vida productiva posterior. Por iso, hai tres obxectivos que a explotación de orixe debe perseguir e son

- 1. Garantizar polo menos un crecemento de 200 gramos/día.*
- 2. Minimizar as patoloxías e as baixas.*
- 3. Potenciar a inmunidade adquirida das beceras.*

Para evitar situacións de baixas e retrasos no crecemento que repercuten negativamente nos parámetros productivos da súa becerra damos a seguinte guía de boas prácticas.

VACAS SECAS NO PERIPARTO

- Nesta fase é aconsellable que os animais non perdan condición corporal. O nutrólogo supervisará que as necesidades nutricionais estean cubertas.*
- O uso de sales aniónicas está recomendado para a prevención da patoloxía postparto.*
- ESÍXESE por protocolo sanitario do Centro VACINAR FRONTE O COMPLEXO DA DIARREA NEONATAL AS VACAS SECAS, como garante dun previo nivel de anticorpos para a transferencia de inmunidade as futuras becerriñas do centro.*

ZONA DE PARTOS

- Recoméndase un lugar limpo, seco e desinfectado.*
- Non precipitar o parto, nin estresar o animal innecesariamente, agardar a unha dilatación correcta antes de calquera manipulación obstétrica.*
- Se resulta necesaria a manipulación, extremar as medidas de hixiene con guantes e xabón e/ou desinfectante.*

DESINFECCIÓN DE EMBIGOS

Inmediatamente tralo parto, empregar unha solución iodada na desinfección do embigo da becerra. Volver repetir o proceso transcorridas unhas doce horas do parto.

UBICACIÓN DA BECERRA

- Recoméndase separar a becerra unha vez seca despois do parto.*
- Recoméndase un aloxamento en sitio seco e limpo, preferentemente individual e afastado dos animais adultos; como solución máis correcta o uso dunha caseta ou box individual orientada en contra do vento.*

- Encamar tantas veces como sexa necesario, con palla, preferentemente para garantir que sempre estea seca.
- A base da caseta baixo a cama mellor de terra, área ou grave para permitir certa capacidade de drenaxe.
- Para evitar transmisión de patóxenos e para lograr unha correcta desinfección, limpar con auga a presión e desinfectar as casetas entre usos, manténdoa en descanso unha semana mínimo antes do seguinte uso. É aconsellable, especialmente, se houbo alguna patoloxía, cambiar a maiores, a ubicación da caseta entre usos.

ENCALOSTRADO

- *Recoméndase administrar o 10% do seu peso vivo.*
- *A becerria ten que tomar polo menos 4 litros de calostro nas seis primeiras horas de vida para garantir un nivel mínimo de inmunización pasiva.*
- *Débase garantir que ese primeiro calostro teña a calidade necesaria para unha correcta transferencia de inmunidade polo cal debe ser de primeiro ordeño, cunha temperatura arredor dos 38°C nun biberón ou caldeiro con tetina, considerando que o caldeiro perde temperatura.*
- *Para valorar a calidade do calostro é desexable o uso dun calostrímetro ou densímetro, un aparello moi sinxelo que se sumerxe no calostro a unha temperatura de 20-22°C e cun código de cores marca a densidade e por tanto a calidade do mesmo. Considérase que a densidade debe ser superior a 1050 gr/L nun calostro de boa calidade.*
- *Para situación de emerxencia aconséllase contar cunha reserva de calostro conxelado. O calostro que se elixa para conservar conxelado deberá ser de boa calidade, e ser correctamente etiquetado para que non aguante moito máis alá de 6 meses. Para o seu uso é aconsellable desconxelalo a baño maría, con auga a menos de 50°C para que non perda propiedades, ou no microondas co programa de desconxelación.*
- *Se a becerriña non mama, será necesario un sondaxe, ben de pé ou en decúbito dorsal, lubricando a sonda co mesmo calostro, antes de usala.*
- *As seguintes 3-4 tomas aconséllase que siga sendo de calostro de segundo e terceiro muxido.*
- *Todo o material empregado tanto biberóns, caldeiros e /ou sondas deben estar perfectamente limpos para o seu uso, xa que a falta de limpeza repercute negativamente nunha correcta transferencia de anticorpos a través do leite.*

ALIMENTACIÓN OS PRIMEIROS DÍAS DE VIDA

O leite maternizado que se usará despois das tomas de calostro, será o mesmo que se usa no centro. A razón é non afectar negativamente o sistema dixestivo cun cambio que supoña un novo factor de estrés para a becerria unha vez se incorpore ao centro. Na elaboración do leite maternizado ter en conta o seguinte:

- *Pesar cunha bascula ou tomar unha medida referencia para garantir unha concentración da mestura de 12.5% (125 gramos nun litro).*
- *Bater e mesturar o leite con auga a 60°C aproximadamente.*
- *Posteriormente mesturala con auga fría ata obter a temperatura desexada.*
- *A temperatura de inxestión debe ser 38-39°C.*
- *Aconséllase que a becerria consuma en lactoreemplazante polo menos o 12 % do seu peso vivo ata a saída ao centro.*

Poñendo uns exemplos

o Para 40 kilos – 4.8 litros ao día

o Para 45 kilos – 5.4 litros ao día

o Para 50 kilos – 6.0 litros ao día

- *Recoméndase ofrecer auga as becerras desde o primeiro día que se ubican na caseta. A auga debe ser renovada a diario e estar nun caldeiro limpo.*

- *No inverno aconséllase temperar a auga e ofrecela polo menos dúas veces ao día.*
- *Non se aconsella ofrecer ningún tipo de forraxo meses primeiros días previos o viaxe o Centro.*

- *Desde o quinto día pódese ofrecer uns 100 gramos de pienso de arranque, que no caso de non ser consumido, deberá ser renovado.*

- *Aconséllase empregar biberóns ou no seu defecto caldeiros con tetina, para incentivar o reflexo de succión e facilitar e homoxeneizar o manexo no centro.*

- *Todo o material empregado tanto biberóns ou caldeiros deben estar perfectamente limpos para o seu uso, xa que a falta de limpeza repercute negativamente nunha correcta transferencia de anticorpos a través do leite.*

VIAXE AO CENTRO

- *Recoméndase que as becerras viaxen ca toma de leite recién feita.*
- *O centro resérvase o dereito de non cargar becerras co embigo infectado, con fiebre ou outros síntomas evidentes de patoloxía.*
- *O propietario debe avaliar e prestar atención os informes que se lle envían de ficha animal de entrada o centro, para detectar as enfermidades repetitivas co obxectivo de efectuar os cambios necesarios para o seu control e/ou erradicación.*

ANEXO II.-

PROGRAMA SANITARIO NA EXPLOTACIÓN DE ORIXE

Seguindo o “Prego de Prescripcions Técnicas para a contratación da concesión da xestión e explotación do centro de recría da Deputación de Lugo Gayoso Castro” no apartado primeiro referente ao manexo de animais e de bioseguridade, así coma o Proxecto de Explotación elaborado por Recría Castro S.L; contemplaranse neste contrato cliente- Recría Castro S.L. unhas medidas referentes a dous elementos básicos: bioseguridade e programa sanitario.

ANTES DA ACEPTACIÓN DUN GANDEIRO COMO CLIENTE será necesaria o cumprimento dunha serie de requisitos na súa explotación:

- A explotación debe **OBRIGATORIAMENTE** ter a cualificación sanitaria de “ Oficialmente indemne a tuberculose e brucelose así como a leucose enzoótica bovina e libre de perineumonía contagiosa bovina”. Presentarase fotocopia compulsada das últimas CINCO follas de calificación sanitaria.
- Considerase **IMPRESINDIBLE E OBRIGATORIO** de cara a minimización de risco de diarreas neonatais no centro que o gandeiro vacine as nais fronte o complexo rotavirus, coronavirus e E coli.
- Considerase **IMPRESINDIBLE E OBRIGATORIO** que a gandeiría forme parte dunha Asociación de Defensa Sanitaria, da que facilitará o contacto para a fluidez na comunicación con respecto a situación xeral da granxa e relativa as nais das novillas incorporadas. A razón de que sexa obrigatorio non é outra que a inviabilidade económica e falta de practicidade de que o gandeiro asuma o prezo de calificar sanitariamente a súa explotación cos sangrados correspondentes se esta non pertence a ADS, e garantir que as tenreiras incorporadas son fillas de nais seronegativas.

A explotación non debe ter circulación vírica de IBR E BVD, con resultados seronegativos en animais de 9 a 24 meses, con periodicidad semestral, así como ELISA anticorpos de tanque de leite negativo. Se usase vacinas para

“cortar ou minimizar” a circulación ata a erradicación, a de IBR debe ser marcada.

ANTES DA ACEPTACIÓN DUNHA XOVENCA NO CENTRO esixirase:

- Tenreiras cun mínimo de 15 días de nais presentes na folla de calificación sanitaria. Exame clínico no momento da carga, reservándose o Centro o dereito de deixala na explotación de orixe se presenta un risco sanitario.
- As xovencas que entren no Centro de Recría serán fillas de nais que en analítica de soro teñan o seguinte resultado:

IBR	ELISA AC gE	➤ NEG
BVD	ELISA AC p80	➤ NEG
	ELISA AX	➤ NEG
PARATUBERCULOSE	ELISA AC	➤ NEG
NEOSPOROSE	ELISA AC	➤ NEG

- Cartífaxe de orella BVD antixeno da becerriña con resultado negativo o que descarta que sexa un PI e Elisa paratuberculose negativo o que descarta de inicio que mamase leite con paratuberculose.

ANEXO III.-

DETERMINACIÓNS DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA AS MODIFICACIÓN DE TARIFAS

Tal e como establece o "Prego de Cláusulas Administrativas particulares para a contratación da concesión da xestión e explotación do centro de recría da deputación de lugo Gayoso Castro" no punto 20, a modificación de tarifas que deberán abonar os clientes só poderá ter lugar por calquera dos motivos seguintes:

a) *Por incremento dos gastos de explotación. Os custos de explotación poden variar se se alteran os elementos que os integran e se experimentan aumentos de diferentes partidas que compoñen os mencionados gastos, especialmente alimentación. Para poder revisar as tarifas a pagar polos clientes por esta causa, Recría Castro S.L. deberá achegar un ditame pericial coa estrutura de custos e o incremento experimentado polos custos de explotación, que sempre se suxeitará ao control e supervisión dos servizos da Deputación de Lugo.*

b) *Por incremento das obrigacións financeiras, como consecuencia de novos investimentos ou ampliacións da carteira de servizos, debidamente autorizadas pola Deputación non contempladas no conxunto documental do expediente de adxudicación e do contrato entre Recría Castro S.L e cliente que aquí se detalla.*

En todo caso, o órgano de contratación da Deputación de Lugo aprobará este incremento das tarifas aos usuarios, se se cumpren as condicións sinaladas, respectando unha periodicidade mínima de dous anos, contados desde o acto de inicio do contrato e en períodos sucesivos desde a entrada en vigor da última modificación. Naqueles supostos en que a administración detecte unha diminución dos custos de explotación, por redución de partidas, melloras na xestión que leven redución de custos, maior dispoñibilidade de base territorial que a adscrita á concesión no momento da licitación ou outros, poderá determinar que esa redución de custos trasládese a unha redución das tarifas que se abonen polos usuarios.

ANEXO IV.-

COMPROMISO DE ENVÍO DE XOVENCAS AO CENTRO.

A explotación con
REGAsituada en.....
provincia de e na súa representación
..... con D.N.I.

COMPROMÉTESE A:

Enviar a Recría Castro SL _____ novillas no período dun ano. Este número de animais pode variar nun 20% por causas imprevistas.

RECRÍA CASTRO SL COMPROMÉTESE a reserva dese número de prazas, sen que poda superar a variación de un 20% polo período de un ano.

.....
Asdo. Cliente

.....
Asdo. Responsable Recría Castro S.L

ANEXO V.-

ACEPTACIÓN DE FACILITACIÓN DE DATOS DE EXPLOTACIÓN

A explotación

Con REGA situada en

..... provincia de

Ena súa representación D.

Con D.N.I.

acorda FACILITARLLE libremente os seguintes datos a Recría Castro S.L. para o funcionamento interno do programa de xestión integral de datos.

CLAVE DA OFICINA AGRARIA VIRTUAL:

USUARIO DE CONAFE:

CLAVE DE CONAFE:

USUARIO DE LIGAL:

CLAVE DE LIGAL:

NOME DA ADSG A QUE PERTENCE:

VETERINARIO RESPONSABLE DO PROGRAMA SANITARIO:

.....

TELÉFONO: E-MAIL:

DATOS BANCARIOS. NÚMERO DE CONTA:

ENTIDADE :

IBAN : ES

ANEXO VI.-

O Regulamento de organización e funcionamento do centro de recreo da Deputación, publicouse no BOP n 30 do 6 de febreiro de 2017.

Na páxina web da concesionaria: www.recriacastro.es pode consultarse a información xeral e particular da concesión e da súa execución.

A información xeral tamén está dispoñible na páxina web da Deputación Provincial <http://www.deputacionlugo.org>